

RefluZero



PRODUCTO SANITARIO PARA EL TRATAMIENTO DEL
REFLUJO GASTROESOFÁGICO CON Y SIN ACIDEZ
Y PARA LA **PROTECCIÓN DEL ESÓFAGO**



ANTIRREFLUJO COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una enfermedad funcional asociada a numerosos síntomas típicos, tales como:

- Acidez (pirosis retroesternal)
- Regurgitación ácida o alcalina al tumbarse o debido a la ingesta de alimentos o sustancias irritantes que pueden causar reflujo (alcohol, café, té, chocolate, cítricos, etc.)
- Espasmos
- Dificultad para deglutir pero sin dolor (disfagia)
- Tos irritativa
- Disfonía (voz ronca, afonía)

Estos síntomas pueden estar asociados o no a lesiones inflamatorias erosivas de la mucosa esofágica. Una mala alimentación o un estilo de vida estresante pueden ejercer un efecto importante en la producción de los jugos gástricos, aumentando el ácido gástrico y causando una sensación de ardor irritante y doloroso, sobre todo después de las comidas. Esta acidez excesiva también se puede sentir en la entrada del estómago, con sensaciones de ardor, espasmos, hinchazón y náuseas. La ERGE también puede producirse durante el sueño ya que una postura tumbada hace que los jugos gástricos fluyan al esófago. Debido a que las paredes del esófago no están diseñadas para tolerar los ácidos gástricos, esto causa una sensación de ardor en el pecho.

INDICACIONES

RefluZero es un producto sanitario con una acción mecánica que está indicado para el:

- Tratamiento sintomático de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Reduce rápidamente los síntomas asociados, tales como: acidez (pirosis), regurgitación ácida, dolor epigástrico, tos irritativa y disfonía.
- Tratamiento sintomático de la hiperacidez (dolor ocasional y ardor en el estómago).

RefluZero es una combinación original e innovadora de **condroitín sulfato, ácido hialurónico e hidróxido de aluminio**. **RefluZero** protege frente a la acción irritativa del ácido clorhídrico producido por el estómago.



- **Inicialmente, los comprimidos se disuelven en la boca, lo que estimula la salivación y ofrece un mejor contacto entre los componentes y la pared esofágica, aumentando la protección y la lubricación.**
- **El condroitín sulfato se adhiere a la mucosa gastroesofágica y la protege aislándola del ataque de los jugos gástricos.**
- **El ácido hialurónico, en combinación con las propiedades adhesivas del condroitín sulfato, ayuda a proteger y reparar el tejido dañado del esófago.**
- **El hidróxido de aluminio actúa como un antiácido, reduciendo el impacto de los jugos gástricos sobre la mucosa dañada.**

COMPOSICIÓN Condroitín sulfato en forma de sal sódica, sacarosa, hidróxido de aluminio, carbonato de calcio, agentes antiaglomerantes: mono, di y triglicéridos de ácidos grasos, dióxido de silicio, hialuronato sódico de alto peso molecular; fragancia; edulcorante: glicirricinato de amonio.

ENVASE 20 comprimidos bucodispersables de 1.100 mg.

POSOLÓGIA E INDICACIONES DE USO

POSOLÓGIA: **Adultos y niños a partir de 12 años:** 1-2 comprimidos después de las comidas principales y/o antes de acostarse, o a demanda en caso de aparecer síntomas como dolor de estómago y ardor, según las recomendaciones médicas. **Niños a partir de 6 años:** se recomienda administrar el producto solo después de consultarlo con el médico. Un comprimido después de las comidas principales y/o antes de acostarse, o a demanda en caso de aparición de síntomas como dolor de estómago y ardor. Si fuera necesario, el comprimido se puede dividir en dos dosis iguales.

INDICACIONES DE USO: Comenzar disolviendo los comprimidos en la boca y, posteriormente, masticarlos. Se puede tomar agua o leche después de la ingesta.

EFFECTOS NO DESEADOS El uso prolongado del producto puede producir estreñimiento debido a la acción astringente del aluminio.

CONTRAINDICACIONES Insuficiencia renal. Hipofosfatemia. Hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

EMBARAZO Y LACTANCIA Administrar el producto después de consultarlo con el médico.

ADVERTENCIAS

Este producto no contiene gluten, lactosa ni derivados lácteos.

El producto contiene aluminio, que puede interferir con la absorción de los medicamentos. Los citratos pueden aumentar la absorción del aluminio. En caso de tomar otro medicamento, se debe consultar al médico antes de tomar este producto, no tomar ningún medicamento 1 hora antes y 2 horas después de la ingesta del producto.

No debe excederse la dosis recomendada. En caso de producirse una reacción adversa, suspender el tratamiento y consultar al médico. Tras un breve periodo de tratamiento sin resultados visibles, consultar al médico.

El producto contiene sacarosa, aspecto importante a tener en cuenta en pacientes con diabetes.

No utilizar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad se aplica al producto cuando se conserva adecuadamente en un envase intacto.

Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Distribuidor:



Menarini Consumer Healthcare, SAU
Guifré, 724, 08918
Badalona (Barcelona)
Tel. +34 93 462 88 00
www.menarini.es



rev. 06/06/2021 it/en - Ver. SP

Fabricante:



SOFAR SWISS SA
Via Nassa, 3 - 6900 Lugano (Switzerland)
Phone +41 919232266 • info@sofarswiss.ch
www.sofarswiss.com



SOFAR S.p.A.
Via Firenze, 40
20060 Trezzano Rosa (MI)
Italy